

Agro-Lac®

Reg. Prod A-7657-007 Agrolac

Óptima combinación de proteína láctea, macro minerales, minerales traza orgánicos y vitaminas, fortificada con aditivos especiales para optimizar el desarrollo de sus lechones.

La alta digestibilidad, de la proteína láctea y los antibióticos presentes en nuestra mezcla previenen las diarreas, reducen el estrés y mejoran la utilización del concentrado.

Su Mezcla altamente palatable y dispersable, facilita el mezclado y su consumo. También puede utilizarse como suplemento seco para facilitar el destete y mejorar el desempeño post-destete de la cría.

Piglet



Sustituto de Leche

TIPS

- Los lechones deben recibir calostro las primeras 12 hrs. de vida. El calostro de vaca puede ser utilizado en último caso.

- Proveer agua fresca y limpia al lechón todo el tiempo.

- La jaula-cama del lechón, debe estar limpia, seca, tibia y desinfectada.

- Inyectar Hierro antes del tercer día.

- Ajustar la cantidad a consumir de acuerdo al peso y al apetito del lechón, incrementar gradualmente desde el nacimiento hasta el destete.

- A mayor número de tomas diarias se disminuye la posibilidad de trastornos digestivos.

- **Agro Lac® Piglet** una vez reconstituido puede ser refrigerado hasta por 24 hrs.

- Evitar sobre alimentar para reducir los riesgos de diarrea. En éstos casos, parar la alimentación líquida y ofrecer una solución de electrolitos de alta energía por lo menos 12 hrs.

- Agrupar camadas de 8 a 10 lechones para mejores resultados.

- Los lechones pueden ser destetados desde 5 kg. a 6 kg. de peso corporal.

- En cualquier signo de fiebre o enfermedad consultar a su Médico Veterinario.



USO:

Para la alimentación láctea de Lechones predestete en forma artificial. Proporcione calostro dentro de los primeros 30 minutos de nacida la cría y durante las primeras 24 hrs. Solicite las recomendaciones de crianza (nutrición y manejo), a nuestros asesores.

DOSIS:

Mezclar de 120 a 150 grs de **Agro-Lac® Piglet** en un litro de agua, calentada preferentemente a 38-40°C, disolverlo completamente y servirlo en biberones limpios y desinfectados. Las crías varían en sus necesidades nutricionales debido a Genética y Fenotipo: La cantidad proporcionada se debe ajustar a estos parámetros para logra maximizar el desempeño.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Edad	ml.	Tipo	No. tomas
Día 1	100 ml.	Calostro	5
Día 2 al 7	100 ml.	Agrolac Piglet	5
Día 8 al 14	150 ml.	Agrolac Piglet	4
Día 14 al destete	200 ml.	Agrolac Piglet	4

INGREDIENTES:

Leche Entera Deshidratada, Derivados de Suero Deshidratado de Leche, Leche Descremada en Polvo, Grasa (Spray Dry), Antioxidantes, Semillas Oleaginosas Procesadas y Micronizadas, Lecitina, Fosfato Dicalcico, Carbonato de Calcio, Suplementos de Vitaminas A, D3, E, K, B12, Tiamina, Biotina, Riboflavina, Pantonato de Calcio, Niacina, Cloruro de Colina, Núcleos de Minerales Traza Quelatados, Sulfato de Magnesio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganeseo, Sulfato de Cobalto, Sulfato Ferroso, Saborizantes Naturales, Probióticos, Sulfato de Neomicina y/o Oxitetraciclina.

ADVERTENCIA:

Mantenga éste saco bien cerrado en un lugar seco.

Producto de uso veterinario

